

### СОСТАВ И УПАКОВКА:

---

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:

- 1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
- 2) аннотация.

Лагохилус (*Lagochilus inebrians*); Крапива (*Urtica dioica* L.); Пастушья сумка (*Capsella bursa*); Водяной перец (*Poligonum hydropiper* L.); Тысячелистник (*Achillea millefolium* L.); Татарник (*Onopordum acanthium*); Горец змеиный (*Poligonum bistorta*).

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

---

Фитонциды, флавоноиды (кверцетин, кверцетрин, рутин), лагохилин, витамины А, Д, Е, К, С, муравьиная, пантотеновая кислота, каротиноиды, эфирные масла, дубильные вещества.

### ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

---

- гемостатическое - повышает коагуляционную способность крови вследствие активации плазменных и клеточных факторов свертывания крови;
- антифибринолитическое - подавляются проактиваторы фибринолиза;
- уменьшает проницаемость мельчайших сосудов, закупориваются мелкие поврежденные сосуды;
- стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки;
- стимулирует эритропоэз.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

---

- маточные, желудочно-кишечные, легочные, геморроидальные кровотечения;
- заболевания, связанные с повышенной проницаемостью сосудов (геморрагический диатез);
- улучшение сократительной способности матки;
- для предупреждения повышенной кровоточивости во время хирургических вмешательств.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

---

По 5-10 мл. 3 раза в день до еды, до достижения клинического эффекта. При необходимости можно растворить в 50-100 мл. чая, сока или в тёплой кипячёной воде.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

---

Повышенная свертываемость крови, тромбозы, тромбофлебиты, кишечная непроходимость, печеночная кома. Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

---

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

---

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не отмечено.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

---

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +2°C до +25°C.

В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора, что не влияет на активность препарата.

Срок хранения 24 месяца.