«КАЛЬКУЛИЗИТ»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Брусника обыкновенная (Vaccinum vitis-idaea L.); Пол-пола (Pol-Pola); Почечный чай (Follium orthosiphonis L.); Марена красильная (Rubia tinctorum L.); Аир болотный (Acorus Calamus L.); Толокнянка (Arctostaphylos L.); Цикорий (Cichorium intybus L.).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Флавоноиды, арбутин, эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, соли К, витамины В, С.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

- разрыхляет, разрушает, выводит камни из почек и желчного пузыря;
- мочегонное, желчегонное и солегонное;
- противовоспалительное;
- снижает риск образования камней в почках;
- нормализует минеральный обмен в организме.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей (пиелонефриты, уретриты, циститы);
- мочекаменная болезнь в стадии ремиссии;
- пиелонефрит беременных в стадии ремиссии;
- заболевания, связанные с нарушением минерального обмена (остеохондроз, подагра, не специфические артриты);
- в комплексном лечении желчекаменной болезни (под контролем врача и УЗИ), холециститах, холангитах.

Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, ССГ Узгариш, ул. Навруз, 136 а.
Телефон: (+99895) 1448444; (+99890) 3200380; Факс: (+998 71) 2817161

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям от 2 до 6 лет по 2,5 мл. 2 раза в день до еды.
Детям от 6 до 12 лет по 5 мл. 2 раза в день до еды.
Взрослым по 5-10 мл. 2 раза в день до еды.
При необходимости можно растворить в 50-100 мл. чая, сока или в тёплой кипячёной воде.
Курс лечения составляет 10-15 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Во время лечения ограничить в рационе кислые и мучные продукты, а также соления.
Моча у больных может окрашиваться в красный цвет в связи с содержанием в препарате брусники и марены красильной.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- острая и хроническая почечная недостаточность (гломерулонефриты, ХПН-терминальная стадия);
- тяжелые нарушения функции печени, цирроз;
- сердечная недостаточность (легочно-сердечная недостаточность, НК-2-3);
- индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не отмечено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +2°С до +25°С.

Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, ССГ Узгариш, ул. Навруз, 136 а.
Телефон: (+99895) 1448444; (+99890) 3200380; Факс: (+998 71) 2817161

В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора, что не влияет на активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.

Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, ССГ Узгариш, ул. Навруз, 136 а.
Телефон: (+99895) 1448444; (+99890) 3200380; Факс: (+998 71) 2817161